


# La syphilis, Informations importantes

**Vous êtes homosexuel, gay, bisexuel, ou vous avez des relations sexuelles avec d'autres hommes... alors ces renseignements vous concernent**



Publié à l'origine par le projet pour la santé des hommes gays 2009

## La syphilis, Informations importantes

### **Vous êtes homosexuel, gay, bisexuel, ou vous avez des relations sexuelles avec d'autres hommes... alors ces renseignements vous concernent**

La syphilis est une infection sexuellement transmissible grave mais qui peut être facilement soignée grâce à un dépistage sanguin précoce. En Irlande et dans d'autres pays, la syphilis est une maladie courante chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Vous pouvez transmettre ou contracter la syphilis si vous êtes sexuellement actif, et ce peu importe votre âge, race, classe sociale ou croyance, et que vous fréquentiez des pubs, bars, boîtes, bains saunas, lieux de drague, petites annonces ou l'Internet pour rencontrer d'autres hommes. Cette brochure vous fournira les informations nécessaires sur la prévention, les symptômes, le dépistage et le traitement de la syphilis.

### **Qu'est-ce que la syphilis ?**

A : La syphilis (une bactérie) est une maladie sexuellement transmissible.

### **Q : Comment est-elle transmise ?**

A: Sexe oral non protégé (fellation ou anulingus)

Relation vaginale ou anale non protégée

En utilisant ses doigts ou ses mains

La syphilis peut aussi se transmettre par le contact des plaies ou lésions cutanées et non pas forcément par l'échange de fluides corporels. Ceci veut donc dire que les méthodes vous protégeant du VIH ne vous protègent pas de la syphilis. L'utilisation de préservatifs peut réduire le risque de contamination. La syphilis ne se transmet pas par le contact quotidien, ni en touchant des objets, des vêtements, les sièges de toilette, ni par les piscines et les saunas.

### **Q: Quels sont les signes et les symptômes de la syphilis ?**

A: 50% des gens infectés ne présentent pas de symptômes mais transmettent quand même la syphilis.

Phase 1 (syphilis primaire) Une lésion ou un chancre d'inoculation apparaît entre 10 et 90 jours après la contamination. Il guérit tout seul et disparaît en un mois environ. Il peut apparaître sur le pénis, dans l'aîne, autour ou dans l'anus (ou le vagin) ou autour ou dans la bouche.

Phase 2 (syphilis secondaire) Il y a beaucoup de signes et de symptômes à ce stade comme la fièvre, les maux de tête, la perte de cheveux, les courbatures et d'habitude une éruption cutanée sur tout le corps et plus particulièrement la paume des mains et la plante des pieds. Généralement, cela se guérit tout seul également.

Phase 3 (syphilis tertiaire ou latente) Après la phase 2, la syphilis devient latente (s'endort). Il se peut que vous ne développiez aucun symptôme pendant plusieurs années mais si vous ne la traitez pas, cette maladie pourra gravement endommager votre santé. Si vous avez la syphilis depuis plus de deux ans, vous ne pouvez plus la transmettre mais la maladie peut porter atteinte à votre coeur, vos poumons ou votre cerveau. Cela peut être mortel. Vous devez savoir qu'après deux ans, si vous avez une vie sexuelle active, vous pouvez contracter la syphilis à nouveau et la transmettre à d'autres personnes.

Si vous êtes séropositif, les symptômes syphilitiques que vous présenterez pourront

être différents et vous aurez certainement besoin d'un traitement plus long.

### **Mais je ne présente aucun symptôme !**

A: Il est possible que vous ne présentiez aucun symptôme. Jusqu'à 50% des gens ayant la syphilis ne présentent pas de symptômes mais peuvent quand même contaminer les autres pendant un rapport sexuel.

### **Q: Mais comment puis-je savoir si j'ai la syphilis ?**

A: Grâce à une simple prise de sang. Il est facile de diagnostiquer la syphilis grâce à une analyse sanguine des anticorps. Dans certains cas, dans une clinique génitourinaire (GUM) ou dans une clinique de dépistage des infections sexuellement transmissibles (STI), il est possible de la diagnostiquer en observant le fluide de lésions cutanées au microscope.

### **Et si mon test est positif, qu'est-ce qu'il faut faire ?**

A: La syphilis est une maladie curable grâce à certains antibiotiques. Pour s'assurer que votre guérison soit complète, vous devrez peut-être effectuer plusieurs visites à la clinique.

### **Une fois traité, est-ce que je peux la recontracter ?**

A: Oui. Même après une guérison complète, vous pouvez contracter la syphilis à nouveau en ayant un rapport sexuel avec une personne infectée.

### **Et si mon test est négatif ?**

A: Super ! Mais il vous faudra peut-être refaire un test trois mois après : le corps peut mettre entre 2 et 90 jours (la période de latence) pour produire des anticorps dans le sang. C'est pourquoi il est recommandé de faire un test une ou deux fois par an.

### **Est-ce qu'un test est suffisant ?**

A: Non. Si vous avez une vie sexuelle active et que vous avez plusieurs partenaires, il est conseillé de faire ce test au moins une à deux fois par an.

### **Et la syphilis et le VIH ?**

A: Si on a la syphilis, il peut être plus facile de contracter le VIH. Si vous êtes séropositif, vous pourrez présenter des symptômes différents de ceux présentés normalement. Surtout, faites attention, si vous êtes séropositif et contractez la syphilis, vous pourrez transmettre le VIH plus facilement à votre partenaire. Il est important que vous utilisiez des méthodes de protection, que vous soyez séropositif ou non.

### **Que puis-je faire pour être sûr de ne pas attraper la syphilis ?**

A: Vous avez un partenaire sexuel régulier, vous avez accepté tous les deux d'être fidèles et vous vous êtes fait dépister pour la syphilis.

### **J'aime avoir plusieurs partenaires, que puis-je faire ?**

A: La syphilis est une maladie facilement transmissible même lors d'un seul rapport sexuel. Cependant, plus vous avez de partenaires, plus vous avez de chances de la contracter. Vous pouvez donc réduire les risques en :

- utilisant des préservatifs pour toute relation sexuelle anale (et vaginale)
- utilisant des préservatifs pour toute relation orale (essayez les préservatifs aromatisés)
- lavant les jouets érotiques ou sex toys avant et après toute relation
- utilisant des préservatifs pour tout anulingus (coupez-en un bout et faites-en un carré)
- utilisant des gants en latex pour vous protéger les mains et doigts, notamment lors de fisting.

Rappelez-vous que les lésions syphilitiques peuvent apparaître dans des zones qui ne

sont pas couvertes par les préservatifs, vous n'êtes donc pas complètement protégé. Faites attention qu'il n'y ait pas de lésions ou ni d'exsudation dans votre bouche, sur votre pénis ou votre anus, et ceux de votre partenaire. Si vous n'en êtes pas sûr, abstenez-vous et allez vous faire dépister dans une clinique GUM/STI dès que possible.

Informez-vous et lisez les informations disponibles sur la santé sexuelle des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Contactez votre Centre Gay le plus proche, leur site internet ou leur ligne d'assistance téléphonique.

### **Où puis-je me faire dépister ?**

A: A la Clinique des services de santé pour homosexuels (Gay Men's Health Service Clinic ou GMHS) de Dublin, ou à la Clinique pour homosexuels de Belfast, ou dans votre centre de dépistage local. Veuillez consulter leurs coordonnées sur la page de liens :

GMHS Clinic (sans RDV)

19 Haddington Road, , Dublin 4

Mardi et mercredi de 17h30 à 19h30

Tél : 01-6699553 ou par SMS au 087-941 0934

Gay Men's Clinic (en consultation ou sans RDV)

Royal Victoria Hospital,

Falls Rd., Belfast

Les jeudi de 17h à 19 h. Tél : 028 90-634050

### **Pour de plus amples renseignements sur la syphilis contactez :**

Le GMHS au 01 873 952

Le SGMHP au 021 427 8470

Le projet arc-en-ciel au 028 90 319 030 (+048 depuis la république)

Le projet arc-en-ciel au 028 71 283 030 (+048 depuis la république)

Ligne d'assistance VIH et lutte contre la toxicomanie

République d'Irlande : 1800 459 459

Irlande du nord : 0800 137 437